

Infección por citomegalovirus CMV Enfermedades infecciosas Manual MSD versión para profesionales

Description



- [¿Qué es la infección por citomegalovirus?](#)
- [¿Cuál es el tratamiento recomendado?](#)
- [Vasectomía en Leñ: Desmontamos los Mitos más Comunes. La Técnica sin Bisturí.](#)
- [Ecografía testicular](#)

Content

También puede realizarse en personas que presenten síntomas inespecíficos que puedan estar relacionados con una infección por citomegalovirus. Conclusión, el examen de IgG para citomegalovirus es una prueba serológica importante para determinar la presencia de anticuerpos contra el virus en una persona. La prevención también juega un papel fundamental en la transmisión del citomegalovirus durante el embarazo.

¿Qué es la infección por citomegalovirus?

Una vez que el citomegalovirus ingresa al cuerpo de una persona, permanece allí de por vida y se puede reactivar. Incluso los pacientes que reciben inyecciones oculares requieren terapia sistémica para prevenir la infección del ojo contralateral y los tejidos extraoculares por CMV. La terapia antiviral intravítrea se debe usar en combinación con la terapia sistémica para pacientes con retinitis por CMV que amenaza la vista de inmediato (es decir, una enfermedad que involucra o está cerca del nervio óptico o la mácula). Maribavir es un medicamento oral para el tratamiento de [cmgv.es](#) la enfermedad por CMV (citomegalovirus) refractario. La retinitis por CMV, que aparece con mayor frecuencia en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), se trata con antivirales sistémicos.

¿Cuál es el tratamiento recomendado?

El citomegalovirus es la segunda causa de síndrome mononucleósido, la primera de infección congénita en nuestro medio y presenta gran morbimortalidad en los pacientes inmunodeprimidos, fundamentalmente trasplantados de órganos sólidos, médula ósea e infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Si bien la mayoría de las personas jamás desarrollan síntomas después de la exposición, el período de incubación parece ser de tres a 12 semanas. La dermatología es la rama de la medicina que se ocupa del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de la piel, el cabello, las uñas y las mucosas.

Vasectomía en León: Desmontamos los Mitos más Comunes. La Técnica sin Bisturí.

La Comunidad de Madrid es una de las siete comunidades que ha iniciado hoy la campaña de vacunación de la gripe y del Covid-19 y que se espera que se prolongue hasta el próximo 31 de enero. Diagnóstico microbiológico de las infecciones por herpesvirus. En España, salvo en unidades muy especializadas, existe un gran desconocimiento sobre la infección congénita por CMV. El cribado sistemático en orina al nacimiento no se considera coste-efectivo y, mientras siga siendo así, las secuelas tardías no serán detectables ni tratables de forma precoz.

- Se desconoce la prevalencia en gestantes y en recién nacidos, así como el número de niños con secuelas atribuibles a la infección congénita.
- CMGV Group Insumos Y Servicios está trabajando en actividades de Almacenes, Compras.
- Si una mujer adquiere el CMV en el embarazo, puede transmitirlo al bebé.
- Generalmente, esto no implica problemas de salud significativos, pero es importante tomar precauciones para evitar la transmisión del virus.
- Aunque habitualmente se trata de una enfermedad autolimitada y leve, puede adquirir mayor gravedad, y ser incluso mortal en pacientes ancianos o con enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas.
- Los síntomas de esta infección son inespecíficos e incluyen dolor muscular, fiebre alta y ganglios inflamados.

Sin embargo, si la IgM es reagente y la IgG es no reagente, indica una infección aguda por citomegalovirus, lo cual es más preocupante y requiere tratamiento. Es importante saber interpretar correctamente los resultados del examen de IgG para citomegalovirus. Los síntomas de esta infección son inespecíficos e incluyen dolor muscular, fiebre alta y ganglios inflamados. Para confirmar la infección por citomegalovirus, es necesario realizar un examen de sangre indicado por el médico. Si una mujer adquiere el CMV en el embarazo, puede transmitirlo al bebé. La mayoría de las personas con CMV no se enferma y tampoco saben que están infectadas.

¿Qué es la ecografía urológica? Una prueba tanto para hombres como para mujeres

Cuando aparecen síntomas son similares a un cuadro seudogripal, con fiebre, odinofagia, malestar general, astenia e hipertransaminasemia. Así, puede producirse enfermedad neonatal por una primoinfección materna (lo más frecuente, en 25-75%) o por una recurrencia (0,2-2%)¹. La transmisión intraútero se produce vía placentaria² y está relacionada con la inmunidad materna, que no confiere protección absoluta.

¿Cuántos tipos de citomegalovirus hay?

El citomegalovirus (CMV, herpesvirus humano tipo 5) puede causar infecciones de gravedad variable. También se utilizan ocasionalmente y con precaución Foscarnet o Cidofovir en pacientes resistentes a los anteriores antivirales por los efectos adversos que pueden ocasionar a los riñones.

En pacientes inmunodeprimidos se pueden utilizar antivirales (Ganciclovir, Valganciclovir, Valaciclovir). La mayoría de la gente sana no presenta síntomas con la infección del virus o puede presentar síntomas similares a un resfriado común. Una vez infectado, el virus permanece en el cuerpo durante toda la vida, con la posibilidad de reactivarse si se debilita el sistema inmune. El citomegalovirus es un virus de la familia de los herpesvirus que causa en personas sanas un cuadro similar a una gripe y en personas inmunodeprimidas síntomas similares a la mononucleosis.

Ecografía testicular

Una vez establecido el diagnóstico de infección fetal el objetivo es determinar si el feto desarrollará síntomas al nacimiento. La amniocentesis debe realizarse a partir de la semana 21, cuando el feto ya excreta orina en líquido amniótico¹⁸. Las gestantes con seroconversión demostrada o anticuerpos IgM positivos (que pueden durar hasta 9 meses tras la primoinfección) son candidatas a realizar amniocentesis como técnica de diagnóstico prenatal¹⁴, una vez determinada la infección materna.

El hallazgo de AC IgG CMV positivo indica infección pasada en algún momento durante la vida de ese individuo no pudiendo determinar el momento. Las personas que tienen contacto frecuente con niños pequeños podrán tener mayor riesgo de infección por CMV porque los niños pequeños son una fuente común de este virus. El tratamiento del citomegalovirus se basa en la administración de medicamentos antivirales. La mayoría de las personas se han infectado con el citomegalovirus (CMV), pero no presentan síntomas. Las personas con el sistema inmunitario debilitado que se infectan por el CMV pueden tener síntomas más graves que afectan los ojos, los pulmones, el hígado, el esófago, el estómago y los intestinos. En nuestro centro médico, tratamos una amplia gama de afecciones dermatológicas.

Category

1. cmgv.es

Date Created

30 de agosto de 2026

Author

adminlx